

مژرا® ٤٠

مژسترو استات

قرص

تمام مطالب این برگه راهنما را قبل از شروع مصرف این دارو به دقت مطالعه کنید.

- این برگه را نزد خود نگه دارید. ممکن است دوباره نیاز به مطالعه آن داشته باشید.
- در صورتی که سؤالات بیشتری دارید از پزشک یا داروساز خود پرسید.
- این دارو برای شما تجویز شده است. از توصیه آن به دیگران اجتناب کنید. این دارو ممکن است برای آن‌ها مضر باشد.
- در صورت تشدید عارضه جانبی یا بروز عارضه جانبی که در این برگه ذکر نشده باشد، پزشک یا داروساز خود را مطلع سازید.

در این برگه راهنما می‌خوانید:

۱. مژرا چیست و به چه منظور مصرف می‌شود؟
۲. قبل از مصرف مژرا
۳. چگونه مژرا مصرف می‌شود؟
۴. عوارض جانبی احتمالی
۵. شرایط نگهداری مژرا
۶. سایر اطلاعات

۱. مژرا چیست و به چه منظور مصرف می‌شود؟

مژرا حاوی ماده موثره مژسترو استات است. مژسترو استات متعلق به گروه دارویی پروژسترون می‌باشد و در درمان نوع مشخصی از سرطان‌های هورمونی شامل سرطان سینه، رحم و پروستات به کار می‌رود. همچنین مژسترو استات در درمان هایپرپلازی آندومتر و گرگرفتگی نیز استفاده می‌شود.

۲. قبل از مصرف مژرا

مژرا را مصرف نکنید

• اگر به مژسترو استات حساسیت دارید.

هشدارها و احتیاط‌ها

قبل از استفاده از مژرا از پزشک یا داروساز خود کمک بگیرید، اگر مشکلات شدید کبدی یا سابقه لخته شدن خون (ترومبوفلیت) دارید یا اخیراً به آن مبتلا بوده اید و یا اگر مبتلا به دیابت هستید، زیرا مصرف مژرا سبب افزایش فشار خون می‌شود. اگر سن شما بالای ۶۵ سال است، پزشک شما ممکن است گاهی عملکرد کلیه شما را بررسی کند و این عمل با کاهش سن بیمار نیز کمتر می‌شود.

داروهای دیگر و مژرا

در صورتی که دارویی جدید مصرف می‌کنید یا اخیراً دارویی جدید مصرف نموده اید و یا احتمال مصرف دارویی جدید را در آینده می‌دهید؛ با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

بارداری و شیردهی

مژرا را مصرف نکنید اگر شما باردار یا شیرده هستید، یا احتمال می‌دهید باردار باشید و یا قصد باردار شدن را دارید.

مژرا حاوی لاکتوز است

اگر توسط پزشک به شما گفته شده است که قادر به تحمل بعضی از قندها نیستید، قبل از استفاده از مژرا با پزشک خود مشورت کنید.


۳. چگونه مژرا مصرف می‌شود؟

دارو را دقیقاً طبق دستورالعملی که پزشک شما گفته است، مصرف کنید. در صورتی که مطمئن نیستید، روش مصرف را، با پزشک یا داروساز خود بررسی کنید. برای درمان هایپرپلازی آندومتر: ۲۰ تا ۴۰ میلی گرم در روز به مدت ۱۴ روز در هر ماه.

برای درمان سرطان سینه: ۱۶۰ میلی گرم در روز به صورت تک دوز یا دوزهای مجزا (۴۰ میلی گرم).

برای درمان سرطان رحم: ۴۰ تا ۳۲۰ میلی گرم در روز در دوزهای مجزا. برای درمان سرطان پروستات: ۱۲۰ میلی گرم در روز همراه با مصرف دی اتیل استیل بسترول ۰.۱ میلی گرم در روز. قرص را همراه با یک لیوان آب میل کنید.

مصرف این قرص برای کودکان توصیه نمی‌شود. برای تأثیر مژرا، حداقل باید دو ماه قرص مصرف گردد. بسیاری از بیماران حتی به



آنگ فارم
با هم برای شما

مدت چندین سال مژرا را مصرف می کنند.

اگر مصرف مژرا را فراموش کردید

در صورت فراموش کردن مصرف دارو، در هر زمان که به خاطر آوردید بلافاصله دارو را مصرف نمایید مگر اینکه نزدیک زمان مصرف دوز بعدی دارو باشد. هرگز دو دوز را با هم استفاده نکنید.

اگر مژرا را بیش از اندازه مصرف کنید

در صورت استفاده بیش از میزان تجویز شده، می بایست بلافاصله با بخش اورژانس نزدیکترین بیمارستان و یا با پزشک خود تماس بگیرید.

ع. عوارض جانبی احتمالی

همانند همه داروها، مژرا نیز ممکن است عوارض جانبی ایجاد نماید اگرچه همه افراد به آن مبتلا نمی شوند.

اگر شما متوجه هر یک از این علائم شدید، مصرف مژرا را متوقف کنید و سریعاً به پزشک خود مراجعه کنید. این علائم شامل ورم صورت، لب ها یا زبان، خارش یا تاول پوستی، تنگی نفس می باشد. این علائم نشان دهنده ی یک واکنش آلرژیک می باشد.

عوارض جانبی دیگر شامل:

عوارض جانبی بسیار شایع (ممکن است از هر ۱۰ نفر، بیشتر از یک نفر را مبتلا کند):
افزایش اشتها و وزن (با احتیاس آب همراه نیست)، تنگی نفس، گر گرفتگی، قرمز شدن صورت و گردن، افزایش فشار خون، افزایش قند خون، یبوست، تورم رگ منجر به لخته شدن خون، لخته شدن خون در ریه .

علائم لخته شدن خون می تواند شامل عدم هماهنگی حرکات بدن، لکنت زبان، درد در کشاله ران، درد یا بی حسی در بازو یا پاها (به خصوص در کشاله ران)، تنگی نفس، ضعف، سردرد و بی حالی باشد. اگر شما مبتلا به هر یک از این علائم شدید، سریعاً به پزشک خود مراجعه کنید.

عوارض جانبی شایع (ممکن است از هر ۱۰۰ نفر، بین ۱ تا ۱۰ نفر را مبتلا کند):

افزایش موقت در علائم و نشانه های بیماری مانند تغییر در حالت، بی حسی، درد یا مور مور در انگشت ها یا شست، حمله قلبی، ریزش موها، اسهال، خستگی، احساس ضعف، ناتوانی جنسی، نفخ، تکرر ادرار، احساس بیماری و بیمار بودن، تغییر در خونریزی واژینال (خونریزی بیش از حد یا لکه بینی)، تجمع مایع که باعث تورم شود (عمدتاً در مچ پا)، درد، خارش یا تاول که منجر به کهیر شود.

۵. شرایط نگهداری مژرا

این دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت و درون جعبه نگهداری نمایید.
دارو را پس از تاریخ انقضاء که روی جعبه و بلیستر بعد از عبارت "EXP" درج شده است مصرف نکنید.
داروها نباید در فاضلاب یا به همراه زباله های خانگی دور ریخته شوند. نحوه دور انداختن داروهایی که دیگر به آن ها نیازی ندارید را از داروساز خود پرسید. این اقدامات به حفظ محیط زیست کمک می کند.

۶. سایر اطلاعات

ترکیبات مژرا

ماده موثره این دارو شامل ۴۰ میلی گرم مژسترونل استات می باشد.

شکل ظاهری مژرا و محتوای بسته بندی

مژرا ۴۰ بصورت قرص سفید رنگ و گرد موجود می باشد.
مژرا ۴۰ در جعبه های حاوی ۳ عدد بلیستر که هر بلیستر شامل ۱۰ عدد قرص است، موجود می باشد.

دارنده پروانه ساخت و محل ساخت:

کارخانه داروسازی آتی فارمد، کرج- ایران

