

این دارو برای شرایط فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

موارد مصرف:

پریکوئین به عنوان جانشین استروژن در درمان نارسایی اولیه تخمدان، علائم واژوموتور در دوران یائسگی، خشکی، التهاب و تحلیل رفتن واژن، پیشگیری از پوکی استخوان پس از دوران یائسگی، کمبود استروژن ناشی از برداشتن تخمدان، تبیلی تخمدان، سرطان منتشر شده سینه در برخی مردان و زنان یائسه و یا زنانی که تخمدان خود را برداشته‌اند و سرطان پروستات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پیشر از مصرف دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- در صورت وجود حساسیت به استروژن‌ها و سایر ترکیبات موجود در این دارو
- در زنان یائسه مصرف استروژن‌ها ممکن است خطر ابتلا به سرطان سینه، رحم و تخمدان را افزایش دهد. بنابراین حائز اهمیت است که به طور منظم توسط پزشک متخصص جهت تشخیص زود هنگام این مشکلات و بیماری‌های جدی معاینه و آزمایش شوید.
- در صورت مصرف در بارداری و شیردهی: مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی ممنوع می‌باشد.
- در صورت مصرف در کودکان: مصرف این دارو در کودکان و یا نوجوانان در حال رشد ممکن است باعث کند شدن و یا توقف رشد شود.
- در صورت مصرف سایر داروها بخصوص سیکلوسپورین، داروهایی که باعث سمیت کبدی می‌شوند بخصوص دالترون و ایزونیاژید، بروموکریپتین، مکمل‌های کلسیم، کورتیکواستروئیدها، گلوکوکورتیکوئیدها، کورتیکوتروپین (مصرف طولانی مدت)، القاءکننده‌های آنزیم سیتوکرم (CYP3A4) P450 3A4 مانند کاربامازپین، دکزامتازون، مپروپامات، فنوباریتال، فنیل بوتازون، فنی توتین، ریفامپین، مهارکننده‌های آنزیم (CYP3A4) P450 3A4 مانند سایمتیدین، کلاریترومایسین، اریترومایسین، آب گریپ فروت، ایتراکونازول، کتوکونازول و یا ریتوناویر، داروهایی که باعث التهاب کیسه صفرا می‌شوند بخصوص دیدانوزین، لامی وودین و زال سیتابین، پروزستین‌ها، استعمال سیگار، سوماتروپین و تاموکسیفن
- در صورت ابتلا به سایر بیماری‌ها بخصوص خونریزی‌های بی‌دلیل و غیرعادی رحم، وجود لخته خون در رگ‌ها و ریه‌ها، ترومبوز وریدی عمیق (مانند پاها)، شروع ناگهانی دوبینی، ضخیم شدن دیواره رحم، تومور وابسته به استروژن، اختلال عملکرد کبد و یا وجود بیماری‌های کبدی به ویژه بیماری‌هایی از نوع انسدادی، سابقه لخته شدن خون در رگ‌ها در نتیجه مصرف استروژن‌ها، بالا بودن سطح کلسیم خون که باعث سرطان استخوان و یا سرطان پیشرفته سینه می‌شود، شروع ناگهانی میگرن، سکنه قلبی، پورفیری، بیرون‌زدگی ناگهانی چشم، سکنه مغزی، وجود لخته خون در رگ‌ها و شریان‌ها و یا ریه‌ها، از دست دادن کامل و یا قسمتی از بینایی.

مصرف در بارداری و شیردهی:

- بارداری: این دارو طبق طبقه بندی سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) در گروه X قرار دارد و مصرف آن در دوران بارداری و همچنین در چند ماه اول پس از زایمان ممنوع می‌باشد.
- شیردهی: این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود لذا مصرف آن در دوران شیردهی ممنوع می‌باشد.

هشدار:

- در طی دوره درمان با این دارو به صورت سالیانه و یا در فواصل زمانی کوتاه‌تر بنا به تشخیص پزشک متخصص جهت انجام معاینات و آزمایشات لازم به پزشک خود مراجعه نمایید.
- این دارو ممکن است سبب بروز مشکلات دندانمانند حساس شدن، ورم کردن و خونریزی از لثه‌ها شود. لذا به طور مرتب دندان‌های خود را مسواک زده، از نخ دندان استفاده نموده، لثه‌های خود را ماساژ داده و دندان‌های خود را نزد دندانپزشک جرم‌گیری نمایید. در صورتیکه هر سوالي در ارتباط با نحوه مراقبت از دندان‌ها و لثه‌های خود دارید و یا در صورتیکه حساسیت، ورم و خونریزی از لثه‌ها آزاردهنده شد به دندانپزشک خود مراجعه نمایید.
- به طور مرتب خودتان پستان‌هایتان را معاینه نموده و در صورت تشخیص و دستور پزشک ماموگرافی و آزمایشات لازم را انجام دهید. در صورت مشاهده هر توده و یا ترشحات در پستان‌ها موارد را سریعاً به اطلاع پزشکتان برسانید.
- اطلاع داشته باشید که با مصرف این دارو ممکن است خونریزی قاعدگی مجدداً آغاز شود اما با ادامه درمان برای مدت ۱۰ ماه خونریزی قاعدگی متوقف خواهد شد.
- اطلاع داشته باشید که خونریزی میان دوره قاعدگی در طی ۳ ماه اول درمان با این دارو اتفاق می‌افتد. در صورت بروز این اتفاق مصرف دارو را قطع نکنید. در صورتیکه خونریزی رحمی غیرعادی بود و یا ادامه پیدا کرد و یا در صورتیکه پرید نشدید و یا مشکوک به بارداری شدید سریعاً به پزشک خود مراجعه نمایید.
- در صورتیکه قصد انجام آزمایش دارید پزشک خود را از مصرف این دارو مطلع فرمایید. نتایج یکسری از آزمایشات و نمونه برداری از بافتها ممکن است تحت تاثیر مصرف این دارو قرار گیرند.
- قبل از شروع مصرف این دارو و در هر زمان که نسخه شما مجدداً تجویز شد برکه راهنمای دارو را به دقت مطالعه فرمایید.
- دوره درمان را کامل کنید.
- جهت کاهش حالت تهوع، دارو را همراه و یا بلافاصله پس از غذا میل نمایید.
- در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو به محض یادآوری دوز فراموش شده را مصرف نمایید ولی چنانچه تقریباً زمان مصرف دوز بعدی فرارسیده است دوز فراموش شده را مصرف ننموده و دوز بعدی را دو برابر ننمایید.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار و نحوه مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند ولی مقدار معمول مصرف این دارو به شرح زیر می‌باشد:

مقدار مصرف در بزرگسالان:

- در درمان التهاب و خشکی و تحلیل رفتن واژن و یا علائم واژوموتور در دوران یائسگی و یا تحلیل رفتن

قسمت خارجی آلت تناسلی:


از راه خوراکی ۳۰۰ میکروگرم (۰/۳ میلی‌گرم) به صورت دوره‌ای و یا پیوسته، تنظیم دوز بعدی بر اساس پاسخ بیمار انجام می‌شود.

توجه: ممکن است دارو همراه با شکل واژینال آن مصرف شود.

- در درمان سرطان سینه (غیرقابل جراحی و پیشرفته در برخی مردان و زنان یائسه):

از راه خوراکی ۱۰ میلی‌گرم سه بار در روز برای مدت حداقل سه ماه.

- کمبود استروژن ناشی از برداشتن تخمدان و یا نارسایی اولیه تخمدان:



از راه خوراکی ۱/۲۵ میلی‌گرم در روز که به صورت دوره‌ای تجویز می‌شود. جهت تنظیم دوز نگهدارنده استروژن از کمترین دوزی که علائم را کنترل می‌کند استفاده می‌شود.

- **تنبلی تخمدان:**

از راه خوراکی ۱/۲۵ میلی‌گرم در روز که به صورت دوره‌ای تجویز می‌شود. جهت تنظیم دوز نگهدارنده استروژن، از کمترین دوزی که علائم را کنترل کرده و واکنش دیواره رحم را به حداقل می‌رساند استفاده می‌شود.

- **پیشگیری از پوکی استخوان در دوران یائسگی:**

از راه خوراکی ۰/۳ میلی‌گرم یکبار در روز به صورت دوره‌ای و یا پیوسته. دوز نگهدارنده بر اساس پاسخ بیمار به درمان تنظیم می‌شود.

- سرطان پروستات (غیرقابل جراحی و پیشرفته):

از راه خوراکی ۱/۲۵ تا ۲/۵ میلی‌گرم سه بار در روز.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود لکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- عوارضی که نیاز به توجه پزشکی دارند:

- **عوارض شایع:**

دردناک و یا حساس شدن پستان‌ها در خانم‌ها و همچنین آقایانی که این دارو را برای درمان سرطان پروستات مصرف می‌نمایند، بزرگ شدن پستان‌ها در آقایانی که برای درمان سرطان پروستات این دارو را مصرف می‌نمایند، واکنش‌های حساسیتی و ورم

- **عوارض با شیوع کمتر و یا نادر:**

توقف قاعدگی، خونریزی شدید، لکه بینی، تومور در پستان‌ها، درد قفسه سینه، سنگ صفرا، التهاب کبد، التهاب کیسه صفرا، عفونت جنب، خونریزی واژینال

فقط در مردانی که این دارو را برای درمان سرطان سینه و پروستات مصرف می‌کنند علاوه بر عوارض جانبی فوق موارد زیر نیز ممکن است اتفاق بیفتد:

تشکیل لخته و آمبولی ریوی

- **عوارض با شیوع ناشناخته:**

تشدید و یا بدتر شدن آسم، سرطان سینه، زردی، ضمیم شدن دیواره رحم و یا سرطان رحم، صرع، اریتم مولتی فرم، التهاب بخشی از لایه چربی پوست، تشکیل کیست در سینه‌ها، جوش‌های خونریزی‌دهنده، همانژیوم کبدی، بالا رفتن سطح کلسیم خون، کاهش سطح کلسیم خون، اختلال بدون علامت عملکرد کبد، لوپوس اریتماتوز، سکنه قلبی و یا تشکیل لخته خون در عروق کرونری، التهاب اعصاب، آسیب اعصاب چشم شامل التهاب اعصاب چشم و یا ایجاد لخته خون در شبکیه، سرطان تخمدان، تپش قلب، پورفیری، آمبولی ریوی، دفع سدیم، سکنه مغزی، تشکیل لخته خون در رگ‌ها، افزایش سایز فیبروم خوش خیم رحم، تشکیل لخته خون در ورید

- عوارضی که در صورت تداوم و یا آزار نیاز به توجه پزشکی دارند:

- **عوارض شایع:**

درد شکمی، دل پیچه و نفخ، بی اشتها، اضطراب، ضعف، کمردرد، التهاب پرونش‌ها، یبوست، کیست، افسردگی، گیجی، پریدود دردناک و شدید، سوءهاضمه، آنفولانزا، ورم، عفونت قارچی، سردرد، گر گرفتگی، عفونت، بیخوابی، ترشحات واژن، جراحی و آسیب ناگهانی، سردردهای میگرنی، التهاب مجاری بینی، حالت تهوع، گردن درد، کپیر، گلو درد، راش پوستی، سینوزیت، قرمزی و التهاب پوست، عفونت مجاری تنفسی فوقانی، عفونت مجاری ادراری، التهاب واژن، عفونت قارچی واژن و افزایش وزن

- **عوارض با شیوع کمتر:**

آکنه، عفونت منانه، عفونت قارچی، سرفه، اسپهال، آمیزش جنسی دردناک، سوزش ادرار، تغییر خلق و خو، خستگی، التهاب دستگاه گوارش، عفونت ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس، پرمویی، پرفشاری خون، بی‌حسی، عدم تحمل لنزهای چشمی، کاهش میل جنسی، افزایش میل جنسی، اسپاسم و گرفتگی عضلات، احتقان بینی، آرتروز، آبسه دندان، ترشحات واژن و استفراغ

- **عوارض با شیوع ناشناخته:**

تغییر اشتها، افزایش سطح قند خون و یا کاهش تحمل گلوکز، تغییر در ترشحات دهانه رحم، تغییر رنگ پوست به رنگ قهوه‌ای روشن و یا تیره، تشنج، زوال عقل، عفونت مجاری ادراری، ترشح شیر از نوک پستان‌ها، تحریک پذیری، گرفتگی پا، عصبی شدن، علائم شبه علائم قبل از قاعدگی، بیرون‌زدگی قرنیه چشم، افزایش سطح تری‌گلیسرید خون، واریس، اختلالات بینایی، افزایش وزن

- عوارضی که نیاز به توجه پزشکی ندارند:

- **عوارض با شیوع ناشناخته:**

ریزش موی سر

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت و درون جعبه نگهداری نمایید.

- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

دارنده پروانه ساخت و محل ساخت:

شرکت داروسازی آتی فارمد

کرج-ایران

