

این دارو برای شرایط فعلی شما تجویز شده است لذا از توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

موارد مصرف

این دارو یک قرص اورژانسی ضد بارداری می باشد که تنها حاوی پروژستین بوده و جهت پیشگیری از بارداری به دنبال نزدیکی جنسی محافظت نشده و یا در مواردی که راه های دیگر پیشگیری از بارداری مشکوک به شکست خوردن می باشند استفاده می شود. جهت اثربخشی دارو، حتماً بایستی بلافاصله پس از نزدیکی جنسی و یا حداکثر ۷۲ ساعت بعد مصرف شود.

پیش از مصرف دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- در صورت وجود حساسیت به لوونورژسترل، سایر پروژستین ها و سایر ترکیبات موجود در این دارو؛
- در صورت مصرف در سالمندان: این دارو برای زنان یائسه مورد مصرف ندارد؛
- در صورت مصرف در نوجوانان: مصرف این دارو در نوجوانان کمتر از ۱۷ سال تنها با تجویز و تشخیص پزشک متخصص مجاز می باشد؛
- در صورت مصرف در کودکان: این دارو برای کودکان قبل از سن بلوغ مورد مصرف ندارد؛
- در صورت مصرف در بارداری: مصرف این دارو در صورت مشکوک و اطمینان به باردار بودن ممنوع می باشد؛
- در صورت مصرف در شیردهی: مقدار کمی از پروژستین ها به داخل شیر مادر ترشح می شوند. لذا مصرف این دارو در دوران شیردهی تنها با تجویز و تشخیص پزشک متخصص و سنجیدن منافع مصرف آن در مقابل مضراتش مجاز می باشد؛
- در صورت ابتلا به سایر بیماری ها بخصوص اختلال عملکرد کبد و کلیه؛
- در صورت مصرف داروهای شیمیایی و گیاهی که باعث تحریک ترشح آنزیم ها بخصوص CYP3A4 می شوند که با متابولیزه کردن پروژستین ها باعث کاهش غلظت پروژستین ها در پلاسما شده و اثربخشی دارو را کاهش می دهند؛
- در صورت مصرف سایر داروها بخصوص باربیتورات ها، بوسنتان، کاربامازپین، فلبامات، اکس کاربازپین، فنی توئین، ریفامپین و توپیرامات.

مصرف در بارداری و شیردهی

- **بارداری:** این دارو طبق طبقه بندی سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) در گروه X قرار دارد و مصرف آن در صورت بارداری و حتی مشکوک بودن به بارداری ممنوع می باشد.
- **شیردهی:** مقدار کمی از پروژستین ها به داخل شیر مادر ترشح می شوند. لذا مصرف این دارو در دوران شیردهی تنها با تجویز و تشخیص پزشک متخصص و سنجیدن منافع مصرف آن در مقابل مضراتش مجاز می باشد.

هشدار

- دارو را بلافاصله و حداکثر تا ۷۲ ساعت پس از نزدیکی جنسی محافظت نشده و یا در مواردی که راه های دیگر پیشگیری از بارداری مشکوک به شکست خوردن می باشند استفاده شود.
- جهت اثربخشی بهتر، دارو را بلافاصله پس از نزدیکی جنسی محافظت نشده و یا در مواردی که راه های دیگر پیشگیری از بارداری مشکوک به شکست خوردن می باشند



- استفاده نمایید. در صورتیکه دارو پس از ۷۲ ساعت مصرف شود تأثیری در پیشگیری از بارداری نخواهد داشت.
- در صورتیکه تا ۲ ساعت پس از مصرف این دارو استفراغ کردید بلافاصله بایستی دوز مصرف شده را مجدداً مصرف نمایید.
 - در صورتیکه ظرف مدت ۳ الی ۵ هفته پس از مصرف این دارو دچار درد شدیدی در زیر شکم خود شدید احتمال وقوع بارداری خارج از رحم وجود دارد لذا سریعاً جهت بررسی این موضوع به پزشک خود مراجعه نمایید.
 - در صورتیکه پس از مصرف این دارو قاعدگی شما به مدت یک هفته از تاریخ خود به تأخیر بیفتد احتمال بارداری وجود دارد.
 - این دارو را به عنوان داروی ضد بارداری روتین مصرف ننمایید.
 - این دارو در خاتمه دادن به بارداری مؤثر نبوده و داروی سقط جنین نمی باشد.
 - این دارو شمارو در برابر ایدز و سایر عفونت‌هایی که از راه جنسی منتقل می‌شوند محافظت نمی‌کند.
 - مصرف این دارو در نوجوانان زیر ۱۷ سال و بعد از بلوغ تنها بایستی با تجویز و تشخیص پزشک متخصص انجام شود.
 - این دارو را می‌توانید در هر زمان از سیکل قاعدگی خود مصرف نمایید.

مقدار و نحوه مصرف دارو

- در صورتیکه قرص ۱/۵ میلی گرمی مصرف می‌نمایید: بلافاصله و یا حداکثر ۷۲ ساعت پس از نزدیکی محافظت نشده و یا در صورتیکه راه‌های دیگر پیشگیری از بارداری مشکوک به شکست خوردن می‌باشند یک عدد قرص را مصرف نمایید.
- در صورتیکه قرص ۰/۷۵ میلی گرم مصرف می‌نمایید: بلافاصله و یا حداکثر ۷۲ ساعت پس از نزدیکی محافظت نشده و یا در صورتیکه راه‌های دیگر پیشگیری از بارداری مشکوک به شکست خوردن می‌باشند یک عدد قرص را مصرف نموده و قرص بعدی با فاصله ۱۲ ساعت بعد از قرص اول مصرف شود.

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود لکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

خونریزی شدید قاعدگی، تبوع، درد زیر شکم، خستگی، سردرد، احساس گیجی، دردناک شدن سینه ها، تأخیر در قاعدگی (بیش از ۷ روز)

شرایط نگهداری

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت و درون جعبه نگهداری نمایید.
- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

دارنده پروانه ساخت و محل ساخت:
شرکت داروسازی آتی فارمد
کرج-ایران

